

【問題VI】 以下の事例を読み、質問に答えなさい。[25]

御茶ノ水夏子さんは22歳の初産婦で、産後1日である。

妊娠経過は正常であった（血圧：120-130/60-76mmHg、尿たん白（-）、尿糖（-）浮腫（-）、体重増加12Kg、Hb:11.5g/dl）。

おとといの明け方から下痢とともに陣痛が周期的になり、分娩第Ⅰ期は32時間、分娩第Ⅱ期は8時間、昨夜11時30分に3400gの男児を経産分娩した。分娩時の出血量は800ml（弛緩出血で子宮収縮剤Atonin05uを5%グルコース500mlに混入して点滴をし、アイスノンを子宮底部に載せやさしく輪状マッサージをしたところ、止血した）。

胎盤はシュルツ式で娩出され、サイズは $18 \times 23 \times 1.5$ cm、500gで卵膜が10cm四方程度欠損していた。出産終了後の子宮底の高さは臍高で右傾し収縮が不良なため出血していたが、分娩後2時間では尿意がないけれども膀胱が充満していたため導尿して500ccの希釈尿が排出され、臍下3横指、収縮は良好となり出血はしていなかった。オロは血性で、後陣痛と創部痛は自制範囲内、（出血に備えいつでも輸液や輸血が可能なように）ラインをキープして深夜の2時に病棟に車椅子（通常は歩いて部屋に帰るが、出血が多く疲労と会陰の痛みも強かったため）で帰室した。会陰部には第2度裂傷が正中と、第1度裂傷が尿道口周囲にできたため、縫合を受けた。

あなたが受け持ちになったので、朝9時に「いかがですか？」と夏子さんに伺ったところ、「とても痛みに弱いので、会陰部が痛くて朝までまったく眠れず、上を向いてじっとしていた。トイレに行きたいたい感じもないし、分娩室から病棟のベッドに移ってからは、一度もトイレに行ってない」といっている。

1. ( ) 内に適切な文字を書き、この時点のバイタルサインの判断基準を述べよ。

1) 血圧 収縮期血圧は最低（90）mmHgを下回らず、最高（160）mmHgを超えない。

拡張期血圧は最高（110）mmHgを超えない。

2) 体温 （38）℃を超えない。

3) 脈拍 通常出産後は（徐脈）脈傾向になる。痛みが強い、出血などによる循環血液量の減少の初期段階、あるいは感染を伴う場合には（奇脈）脈になる。